



ט"ו בשבט ללא תולעים

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקות המזון כהילה"

מעודכן לשנת תשפ"א

1. פירות נקיים לא חיבים בדיקה מותלים

פסיפוליה	חמציות	אתרגז מסוכר	ابتיח
פקאן מסוכר ("פקאן סיני")	לדר (בריאה סגורה)	בננה	אבוקדו
קוקוס (שלם וטוחן)	מלון עגול	בננה צ'יפס	אגוז אורן (צמנובר)
קרםבוליה (פרי הכוכב)	מנגו	דובדבנים מיבשימים	אגוז ברזיל
שזופים מיבשימים	ערמוניים (קלופים וקלויים,	לאחרצנים	אגוז מקדמיה
שימורי משמש	בריאה הרמטית)	(חוותה ארחה"ב בלבד)	אגוז פקאן בקילפה
תפוח סיני מסוכר	פאפאייה	חברים תוצרת חוא"ל	אגוז
תפוח עץ (טרוי ומיבוש)		(בעל קליפה צהובה חלקה)	אננס בשימושים (בטיסוף)

2. פירות שלעיתים גנווים טעונים בדיקה מותלים

אגוזים בקילפתם הקשה (אגוז מלך, בונדוק ושקדים)	בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורוי משי", פירותים כהים או זחלים בקילפה או על האגוז, ואם האגוז נראה מכורסם.
אגוזי בונדוק קלופים ושקדים קלופים	בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצאו "קורוי משי", סימני קרסום או נקב, חוץinos ובודקים אותו מבפנים. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום מבפנים (גם אם לא נמצאה נגיעה), טוב לחוץות כ-10% ולבדוק בפנים).
אגוזי פקאן קלופים	בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורוי משי", תולעים או פירותים כהים עגולים.
אגוזי מלך קלופים	1. מנערמים בתוך מסנן בעלת חרומים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. 2. בודקים את כל האגוזים משני צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורוי משי", תולעים או סימני קרסום.
אגוזים ושקדים קוצצים	מנעררים בתוך מסנן רשת (מסנן אורז) על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנוגר במסנן על משטח לבן ובודקים אם ישנם תולעים, חרקים או "קורוי משי" בין החתיכות.
אגוז קשי	בודקים את כל האגוזים מבחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חוציאים ובודקים אותו בין שני החצאים. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום. (מעט פירותים חומיים דקים בין החצאים הם SHARETTOT HAKILIFAH VLA NIGUOT). גם אם לא נמצאה נגיעה, טוב לחוץ בין שני החצאים).
אוכמניות (AMILIT): יש להשתמש במילוט עם כשרوت מהודרת, רצוי לטחון בבלנדר.	טרiores: ראה בדיקת המזון כהלה, כרך ב'. מיובשות: קשה לבודקם. לכוון רק את המשווקות תחת כשרות מהודרת.
אמונה	קלף ולשטו. לפורום לפלהים ולבדק אם מצויות רימות לבנות בעור הפירות.
אננס	טררי: לקלף ולחשיר את כל החללים החוממים המצויים תחת הקילפה. מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עלי זבובן או חרב.
אפרסמן	מיובש טבעי: לשבור כמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירותים כהים עגולים בחיללים הקטנים שבבשר הפירות. משומר במת' טבעי: עדיף להשתמש בשימושו אוננס בסירופ.
אפרוסט	להוריד את ה"עליה" (שבטיב העוקץ) ולשטו. אם הפרי רך מאד, לבודק מבפנים. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפירות, מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצוי שם רימות לבנות. (נקודות שרירות קטנות בבראש הפרי אין סימן לנגיעה).
גיאבה	בשימורים: להתבונן אם מצוי זחל בפירות או בסירופ. לחתוור פרוטוון לרוחב הפירות, ולהתבונן היטב בכל פרושה משני צדיה אם מצוי רימה. צבע הרימות כצבע הפירות, עם נקודה שחורה קטנה בראשן.
דובדבנים	שיטה חלופתית: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אוורכה כהה רך במיוחד או נקב קטן. לחתוור איזור זה ולהתבונן אם מצוי רימות בתוך הפרי. מסוכרים (לאחרצנים): לחוץ אחדים למדגム (כ-10%) ולבדק אם יש תולעת. אם נמצא תולעת, יש לחוץ את כלום ולבודק מבפנים. בטיסוף: תוצרת אירופה: מותקיים - לפחות כל אחד ולבדק. חמוצים בדרך כלל נקיים. תוצרת ארחה"ב: בחזקת נקי. מיובשים עם החרצן (מצומקינים): בדיקות קשה ועדיף לא להשתמש. מיובשים (לאחרצן): תוצרת ארחה"ב בלבד. בחזקת נקיים.
זיתים	זיתים יוקרים או מושחרים: אם יש כתם כהה, לחוץ ולהתבונן אם מצוי מחלת בתוך הזית. זיתים שחורים: יש לחוץם ולבודקם מבפנים אם מצוי מחלת או תולעת. טבעות זיתים (ירוקים או מושחרים): לשטוח על צחלה וכדומה ולהתבונן אם מצוי מחלת או תולעת.
לדר ללא ארזה	להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.
פיר שלם: משמש מיבוש	פיר שלם: לחוץ ולהתבונן כנגד האור משני הצדדים. פיר חצוי: להשרות במים פורשים, לפחות את הקפלים ולבדק כנגד האור.
ענבים	1. מחלקיםם על כל עינב. אם רואים כתם הענבים במים מעט סבון נזול ושטופים היטב במים זורמים. 2. מסתכלים על כל עינב. אם רואים כתם כהה החודר לתוך העניב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתוכו.
ערמוניים בקילפתם הקשה	לחוץ ולבדוק מבפנים אם מצוי תולעת או פירותים כהים, (אפשר לבדוק גם אחרי הבישול).
פירות מיבשימים:	להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרק. רצוי לשטוף. אגם, אפרסמן, חbos, מלון, מנגו, קיווי, פפאיה
קיווי	פנים הפרי בחזקת נקי. לעתים רחוקות מצויות נקימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפירות בעת הקילוף, או לשטוף את הפרי המוקלף.

המשך ←

רימון	אם מצוי נקב בקליפה, פוחחים ובודקים אם יש תולעת. בעת פירוק הגרגירים יש להתבונן אם מצויות רימות לבונות קטנות או תולעת חומה בין הגרגירים.
שסס	לפתוח ולבדק את ה"כתר" שבתחתית הפרי, אליו עלולים לחדר חרקים קטנים. מגינה פרטית לחוץ ולבדוק אם מצויות תולעים בשער הפרי.
שקדים	ראה אגוזים.
תמר	לחצות בסכין, להוציא את הגלען ולבדק משני הצדדים כנגד האור (לחפש חרק כהה באורך 3-2 מ"מ או תולעת עד"כ מהה, מיבשת וכח).
תמר לח (קפו)	בדרכ כל נקע, טוב לחצותו ולבודק.
הדרים: תפוז, קלמנטינה, ליימון, אטרוג, פומלה, אשכולית, פומלית	נכויות חיצונית: מציה בכל פירות ההדר לעתים קרובות מצויות כינימות צבע חום או אפור כהה על קליפת הפרי. לחילופין ניתן לשטוף היטב את הפרי אחורי הקליפ. אם רוצים לבודק שחכימות לא נצמדו לפרי, וכן שלא עברוழיד או מהסכו לפרי. לחילופין נזון לנקיוי כלים, לשטוף ולבדק שלא נותרו כינימות. נכויות פנימית: עלולה להיות מימצא בתפוזים, קלמנטיניות ואשכוליות עלול להיות נגוע בירימות לבנות. נגיאות זו נדרה כאשר הפרדסים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. פירות מעצים לא מטופלים כגון פריט, או מערבים בשנת שטמה וכן פירות בעונת הקיץ והחיט. אם רוצים לבודק לשטוף במעטם במקומם. א. בעת הקליפ, יש לעיין בצד הלבן של הקליפה אם ישנו כתם חום או אזור רך במיוחד הנמשך לתוך פנים הפרי, ולבדק אם יש חדירה של רימות במקום זה. ב. אם הפרי רך במיוחד או בעל צבע וריח שונה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא פרי נגוע, יש לבדוק היטב את כל הפירות מאותה קניה. מייצודרים - סחות ביתיה: רצוי לנוקות את הפירות בכירית מתחכמת ונזון לנקיוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירתת כינימות למיצ. לחילופין, ניתן לסנן דרך מסננת צפופה. סחות טבעי מסחרי: יש לסנן את המיצ במסננת צפופה.
פייזוחים	גרעיני דלעת: עם קליפה (לבנים): בדרך כלל נקיים. אם הקליפה פגומה, יש לקלף ולבודק. קלופים (ירוקים): לנער במסננת ירקות על גבי משטח לבן ולבדק אם נפלו תולעים על המשטה. אם נמצא תולעים, אין להשתמש. גרעיני אבטחה: לפתוח ולבדק מדגם של כ-10%. אם נמצא נגיעה, יש לפתוח ולבדק את כולם. גרעיני חמניות: עם קליפה (שחורים): ציריך לקלף כל אחד ולבדק. קלופים (אפור בהיר): א. לנער במסננת של אורז על גבי משטח לבן ולהתבונן, אם נשרו חרקים קטנים קטנים על המשטח – אין להשתמש. ב. לפחות את הגרעינים על משטח לבן ולבדק בינויהם, אם נמצא תולעים – אין להשתמש. בוטנים: לבדוק את כולם מבחוץ. בוון בו נמצאו סימני קרוסום או סימן של חזרית תולעת, חוץם ובודקים אם יש בו נגיאות פנימיות. אם נמצא חזרית תולעת, יש לחזות את כולם ולבדק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגיעה, טוב לחזות כ-10% ולבדק בפנים]. בסוף הקיים ובסתוי דרישה חשומת לב מיחודה. בוטנים טחוניים: ראה אגוזים קצובים. בוטנים מצופים (גבוקים, מצופים שוקולד וכדומה): לפתוח כ-10%, אם נמצא נגיעה – לפתוח את כולם. בוטנים בקליפתם הקשה: ראה אגוזים בקליפתם הקשה. פיסטוקים: מקלפים ומתובננים אם יש "קורו מיש" או חל. פיסטוק עליו נראו סימני נגיעה, חוץם ובודקים אם יש בו נגיעה פנימית. אם נמצא תולעת, יש לחזות את כל הפיסטוקים ולבודק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגיעה, טוב לחזות כ-10% ולבדק בפנים].

3. פירות הנגועים לעתים קרובות בתולעים מוחזק כנוגע

היביסוקס	מציה בהם נגיאות בגבואה ואין שיטה בטוחה לנוקותם.
חובשים תוצרת הארץ	חוצים את הפרי. אם מצוי זחל או מחלת עם פירורים כהים, מסירים את האזור הנגוע.
חרובים	לשטוף היטב, לשבר לחתיכות קטנות (2 ס"מ) ולבדק אם מצוים פירורים, קורי nisi או תולעים וחרקים.
פטל	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלכלו.
צימוקים	עקב נגיאות פנימית המציה בצימוקים, כולל צימוקים מקליפורניה, מומלץ להשתמש בחומציות, כתחליף ישיל לצימוקים. במידה וקיימים להשתמש בצימוקים, יש עדיפות להשתמש בצימוקים שעבורו בדיקות מדגמיות, כגון צימוקים שבשהשחת בד"ץ העדה החרדית, אותן יש לבדוק בדיקה יסודית כדלהלן: 1. להשרות את הצימוקים בפחים בעלי כשלחת לבנה ולהתבונן אם מצוים תולעים או חרקים חמומים בהם. 2. להעביר את הרים העליונים לצלה לתבנה ולהתבונן אם מצוים תולעים או חרקים חמומים בהם. במידה ונתקלתה נגיעה, אין להשתמש בצימוקים. 3. אם לא נמצא נגיעה – לשטוף היטב את הצימוקים תחת מים זורמים.
צימוקים מיצור ביתיה. ניתן להכין צימוקים נקיים בתנור בית. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלה ח'ב.	צימוקים מיצור ביתיה. ניתן להכין צימוקים נקיים בתנור בית. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלה ח'ב.
תוֹת עַץ	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלכלו.
תוֹת שָׂדָה	קיימות נגיאות כל-עולםית של "טריפסים" קטנים המסתתרים בשקעים של התותים ואין יורדם בשטיפות הרגילות; אך מומלץ לאכול חותם רך לאחר ניקויים באחד משני האופנים: אוף א: לחזור בסיכון את העלה הרוק עם שכבה דקה מהפה וליחס סדקם, חוץם עמוקים או איזורים פגומים. להשרות במים עם מעט סבון נזלי למשך 3 דקות, לשטוף מעתה בתוך המים, ולשטוף היטב (בכל פעע מעט תותים) תחת זרם מים זורמים באופן שהמים יגיעו לכל הצדדים. יש לחזור על ההשריה והטיפסה שלוש פעמים ולאחר מכן לטוחן או לבשל. אוף ב: קלף שכבה דקה מהפה מכל צדדי (כל השכבה החיצונית כולל חריצים עמוקים ומוקם חיבור העלה) ולשוטפו במים לאחר הקליפ. תוֹת שָׂדָה מִסּוֹכֶר (מיובש עם סוכר): לחזק נקע.
תוֹת גָּגִי (גוגי – בר – מוצר בריאות, הנמכר בחומניות טבע)	מציה בהם נגיאות בגבואה, אין שיטה בטוחה לנוקותם. אפשר לבשל ולסנן דרך מסננת בד, ולהשתמש בתמצית. נגיונון בגבואה ובדיקתן קשה וכורכתבת. ואוף בדיקיה מבואר בספר "בדיקות המזון כהלה".
תְּאַנְּטִים (טריות ומיבשות)	מענה לשאלות בטל' 5325588-02 בוקר ובערב בשעה 11:45-10:45 ובימים שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסה שבת. ניתן להאזין לשיעורי הרוב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפייה באתר: www.kolhalashon.com